بطاقة مريض

اسم المريض: .... الطبيب المقيم: ....

التاريخ: .... / .... / .... الطبيب الاختصاصي: ....

العمر: .... الجنس: .... المهنة: .... رقم الهاتف: ....

العنوان: .... (رقم هاتف شخص قريب): ....

الشكوى الرئيسية: ....

....

معالجات النسج الداعمة السابقة: ....

الأمراض العامة: ☐ قلبية ☐ صدرية ☐ دموية ☐ كلوية

☐ كبدية ☐ عصبية ☐ الغدد الصم

القصة المرضية: ....

....

التحسس الدوائي: .... العادات السيئة: ....

التدخين: ☐ نعم ☐ لا نوعه: .... الكمية اليومية: .... المدة: ....

الأدوية: ....

الفحص خارج الفموي:

الشكل العام للوجه: .... الفتحة الفموية (ملم): ....

المفصل الفكي الصدغي: ....

العضلات الماضغة: .... الجناحية الأنسية: .... الصدغية: ....

حركة الفم الجانبية: ☐ قيادة نابية ☐ قيادة مجموعة جزئية ☐ قيادة مجموعة كاملة

الفحص داخل الفموي:

الشفاه والمخاطية الفموية: .... قبة الحنك : .... قاع الفم: ....


اللسان: .... الميزاب الدهليزي العلوي: .... الميزاب الدهليزي السفلي: ....

الألجمة العلوية: .... الألجمة السفلية: .... لجام اللسان: ....

وضع الأسنان: ☐ طبيعية ☐ متراكبة ☐ متباعدة

خط الابتسام: ☐ طبيعي ☐ مرتفع ☐ منخفض

	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28	
																	الحركة السنية
																	زرعة سنية
FI																	مفترق الجذور *Glickman*
BOP																	النزف عند السبر (إشارة إذا وجد)
PI																	اللويحة (إشارة إذا وجد درجة ≤ 1 *(By Silness and Löe,*
GMP																	توضع الحافة اللثوية
PD																	عمق السبر
CAL																	الخسارة في الارتباط



الخسارة في الارتباط السريري (CAL) = عمق السبر (PD) + موضع حافة اللثة (GMP) أي CAL = PD + GMP

موضع حافة اللثة (GMP): يُقاس نسبةً للملتقى المينائي الملاطي (CEJ) مع مراعاة التالي:

توضع تاجي للحافة (ضخامة لثوية / وضع طبيعي): يُسجل الرقم المُقاس بإشارة (–) ويعوض بالمعادلة كما هو.

توضع ذروي للحافة (انحسار لثوي): يُسجل الرقم المُقاس بإشارة (+) ويعوض بالمعادلة كما هو.


ملاحظة هامة: لتعويض PD و GMP في معادلة ما يجب أن يكون قياسهما قد تم في نفس النقطة وبنفس المحور للسابر

(يمكن تطبيق ذلك بإدخال واحد للسابر وقراءة GMP ثم PD بالترتيب)

	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28	
GMP																	توضع الحافة اللثوية
PD																	عمق السبر
CAL																	الخسارة في الارتباط
PI																	اللويحة (إشارة إذا وجد درجة ≤ 1 *(By Silness and Löe,*
BOP																	النزف عند السبر (إشارة إذا وجد)
FI																	مفترق الجذور *Glickman*
Note																	ملاحظة

Avg. Probing Depth: **mm** Avg. Attachment Level: **mm** BOP: *%* PI: *%*

	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	
Note																	ملاحظة
FI																	مفترق الجذور *Glickman*
BOP																	النزف عند السبر (إشارة إذا وجد)
PI																	اللويحة (إشارة إذا وجد درجة ≤ 1 *(By Silness and Löe,*
GMP																	توضع الحافة اللثوية
PD																	عمق السبر
CAL																	الخسارة في الارتباط



المسافة بين الخط والخط الذي يليه على المخطط = 1 mm

دليل اللويحة الكامل للفم (PI %) = (عدد السطوح المحددة ÷ العدد الإجمالي للسطوح المفحوصة) × 100

نسبة النزف عند السبر (BOP %) = (عدد السطوح المحددة بالنزف ÷ العدد الإجمالي للسطوح المفحوصة) × 100

	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	
GMP																	توضع الحافة اللثوية
PD																	عمق السبر
CAL																	الخسارة في الارتباط
PI																	اللويحة (إشارة إذا وجد درجة ≤ 1 *(By Silness and Löe,*
BOP																	النزف عند السبر (إشارة إذا وجد)
FI																	مفترق الجذور *Glickman*
																	زرعة سنية
																	الحركة السنية

Diagnosis التشخيص

☐ التهاب نسج داعمة

☐ التهاب نسج داعمة كتظاهر لأمراض جهازية (   )

☐ حالات حول سنية أخرى: ضخامات لثوية معممة

Stage (Severity, patient is characterized by the highest stage)			المرحلة (الشدة، يصنف المريض/ة حسب المرحلة الأشد تقدماً)	
	☐ **Stage I**	☐ **Stage II**	☐ **Stage III**	☐ **Stage IV**
فقد العظم الشعاعي (RBL) أو فقد الارتباط السريري (CAL) بين السني	☐ < 15 % ☐ (1 – 2 mm)	☐ 15 – 33 % ☐ (3 – 4 mm)	☐ > 33 % ☐ (≥ 5 mm)	
فقدان الأسنان الناتج عن التهاب النسج حول السنية	☐ لا يوجد		☐ ≤ 4 أسنان	☐ ≥ 5 أسنان
محددات التعقيد السريرية (يتم التأشير عليها بمجرد تحقق عامل واحد...)		☐ PD = 5 mm, فقد عظمي RBL أفقي بشكل رئيسي (PD: عمق السبر)	☐ PD ≥ 6 mm, فقد عظمي عمودي ≥ 3 mm, FI Class II or III (according to Glickman) (PD: عمق السبر ، FI: إصابة مفترق الجذور)	☐ الحاجة لإعادة تأهيل فموي معقد نتيجة خلل الوظيفة المضغية

Extent/Distribution (for the highest stage) الامتداد والتوزع (للمرحلة الأشد تقدماً)

☐ موضَّع (< 30% من الأسنان)   ☐ معمم (≥ 30% من الأسنان)   ☐ نمط قاطع - رحى

Grade (Progression) الدرجة (معدل تقدم المرض)	☐ Grade A	☐ Grade B	☐ Grade C
مؤشر الفقدان العظمي (RBL% / العمر)	☐ < 0,25	☐ 0,25 – 1,0	☐ > 1,0
السكري	☐ لا يوجد	☐ HbA 1c < 7,0 %	☐ HbA 1c ≥ 7,0 %
التدخين	☐ غير مدخن	☐ سجائر/يوم 10 >	☐ سجائر/يوم 10 ≤